História

Fundada en Abril de 1982, Austral comienza sus actividades teniendo como objetivo principal la fabricación de premezclas de vitaminas y minerales para la industria avícola en República Dominicana.

Con el paso del tiempo, se ha ampliado el abanico de productos que se fabrican, destacándose la gran participación en el área de nutrición animal, siendo en la actualidad un líder en este sector. Junto con la fabricación se ha incorporado la representación de diversos productos para la salud animal. Junto al sector avícola Austral también tiene presencia en sectores pecuarios como cerdos, ganado vacuno, equinos, etc.

En el área de biológicos, específicamente Vacunas, contamos con la distribución exclusiva de el laboratorio MERIAL-SELECT para el área avícola.

Además como importadores y fabricantes de productos veterinarios, contamos con el apoyo y abastecimiento de varios suplidores internacionales como:

ADISSEO, A. PINTALIBA, AJINOMOTO, DEGUSSA, INDUKERN, NEOLAIT, ABC COMP, BRILL, M. CASSAB, IMPEXTRACO, entre otros.

Fuerza de ventas

Tenemos una cobertura que nos permite llegar con nuestro equipo de ventas, en su mayoría formado por profesionales del área, a todos los productores del país.

Asistencia técnica

Ofrecemos a los productores asistencia técnica sin costo alguno. Este servicio es brindado por profesionales capacitados en diferentes especialidades, especialmente en nutrición de aves, cerdos y rumiantes.

En el campo de la vacunación, fundamental para obtener resultados eficientes, disponemos de asesoramiento a los productores, proporcionamos y mantenemos los equipos de vacunación y ofrecemos servicio de vacunación en las granjas.

Nuestra estrecha relación con MERIAL-SELECT en los Estados Unidos nos facilita el envío de muestras o las consultas técnicas.

Nuestras instalaciones

Estamos ubicados en la Zona Industrial de Haina, en un espacio de 8,000 metros cuadrados, con un área construida de 2,600 metros cuadrados. Las instalaciones están orientadas a la fabricación de aditivos y productos para la salud animal.

Las áreas que se destacan son:

Almacenamiento de materias primas, como vitaminas puras la cual es cerrada y climatizada para que mantengan su potencia.

Zona de producción con modernos equipos para dosificar y pesar que aseguran la exactitud en el uso de las materia primas.

El área de productos líquidos, con equipos de acero inoxidable para asegurar excelencia en los productos fabricados.

En la zona central del edificio, se encuentra el área de fabricación, con un equipo automático de alta precisión para realizar las mezclas.

Área para la fabricación de productos solubles en sobres, con una moderna envasadora automática.

Área Laboratorio Control Calidad, se analizan las materias primas que llegan y también los productos fabricados, los que deben cumplir con las exigencias de calidad.

Distribución

Para hacer más expedita la distribución contamos con un depósito en la ciudad de Moca, que hace más eficiente el trabajo ya que se ubica en el corazón de la zona de producción pecuaria del país.

Complementando ésta organización tenemos una compañía de transporte que se responsabiliza de la distribución a nivel nacional.

Principales productos y servicios

- Premezclas y núcleos para pollos, gallinas, cerdos y vacas (premezclas de vitaminas y minerales para todas las especies animal)

- Vacunas para pollos, gallinas y cerdos.

- Preiniciadores para cerdos.

- Antibióticos solubles y premix para todas las especies.

- Vitaminas, minerales, energizantes y antiparasitarios solubles para gallinas, pollos y cerdos.

- Materias primas (aditivos para alimentos).

Contamos con asistencia técnica gratuita en campo y nutrición para nuestros clientes.

Ofrecemos servicios de laboratorio para análisis de muestras de tejidos y serología avícola en los laboratorios Merial USA.

CONTENIDO

História *1*
Fuerza de ventas *1*
Asistencia técnica *1*
Nuestras instalaciones *2*
Distribución 2
Contenido 4
Almaril Plus 6
Amox B 7
Amox Plus 8
Amoxicilina 9
Avipirex 10
Bacteromicina 11
Ciprofloxacina 20% 12
C.S.P-250 14
Cocciprot 20% 15
Coccivet 25% 16
Colistina 10% 18
Dayry Iodum 19
Doxiciclina 10% 21
Enro-10 22
ERITRO PLUS 23
Florfenicol 10% 24
Fortalin 25
Fosfomicina Plus Soluble 27
Hepatoprot 28
Hidro-Vi AD3E+C 29
Ivermek Plus 31
Lincomicina-50 32
Maduramicina 33
Micotyl 34
Mixoligo Plus 36
Mucobrom 38
Neumostop 40
Nutracur Sobres 41
Nutracur 42
Nutridazol 43
Penicily + Estrepto 44
Sulfa + Trimetoprim 45
Tektrol 47

Tiamulina 10%	49
Tiamulina Pura	51
Tylo 400	53
Tylo 400 Plus	54
Ubrex	55
Vioprop-11	56
Vita-C	57
Vitamina D3	58
Vitamina E + Selenio	59
Vita-K	60
Vitaminas del Grupo B y Vitamina K	61
VitamInas y Electrolitos	63
Zoovit 1 Mas Enzimas	65
Zoovit 3	66
Zoovit 5	97
Zoovit 7	69

ALMARIL PLUS

Complemento nutricional hidrosoluble.

Composición por litro.
Glucosa ..... 557 gr.
Cloruro Sódico ..... 107 gr.
Glicina ....77 gr.
Ácido Cítrico ....7 gr.
Fosfato monopotásico ....51 gr.
Agua desmineralizada c.s.p. ..... 1 litro.

Acción:
ALMARIL PLUS contiene dos electrolitos fundamentales, sodio y potasio.
Es un suplemento nutricional muy palatable y fácilmente asimilable para aves, especialmente broilers y pollas en crecimiento.
ALMARIL PLUS proporciona agua y electrolitos a los animales jóvenes, así como energía para contrarrestar los efectos del stress y prevenir la falta de apetito.

Indicaciones:
ALMARIL PLUS esta recomendado en casos de:
• Temperaturas elevadas o muy elevadas.
• Inicio del periodo de engorde de los pollos.
• Prevención de la perdida de electrolitos (Ej. por transporte).
• Después de tratamientos antiparasitarios o antibióticos.
• Después de vacunaciones u otro tipo de stress.
• Durante cualquier tipo de enfermedad infecciosa.

Administración:
En el agua de las aves.

Dosificación:
Diluir 1.25 litros de ALMARIL PLUS en 250 galones de agua de bebida durante 2 a 3 días.
Está recomendado para cualquier tipo de aves: pollos de engorde, pollas de reemplazo, ponedoras, pavos, patos.

Contraindicaciones:
No tiene.

Período suspensión:
No tiene.

Precauciones:
Nunca administrarlo puro, siempre diluido.

Condiciones de almacenamiento:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el calor excesivo y la alta humedad.
Mantener los envases bien cerrados y protegidos de la luz.

Presentación:
litro (Cod. 20-330)
2.5 litros (Cod. 20-331)

Amox B

Antibiótico expectorante hidrosoluble.

Composición por litro:
Amoxicilina trihidratada..... 200 gr.
Bromhexina HCl..... ....5 gr.
Vehículo c.s.p.....1.000 cc.

Acción:
AMOX B contiene penicilina y un mucolítico para facilitar el funcionamiento del aparato respiratorio.

Indicaciones:
Contiene una penicilina de amplio espectro de acción y su uso esta indicado en enfermedades infecciosas del tracto respiratorio. Animales con severas infecciones respiratorias que presentan abundantes secreciones en las vías aéreas son beneficiados por la acción mucoltica de este producto.

Administración:
Agua de bebida.

Dosificación:
500 cc Amox B por cada 250 galones de agua.

Contraindicaciones:
No tiene.

Periodo suspensión:
7 días.

Duración del tratamiento:
5-7 días.

Precauciones:
No dejar al alcance de los niños.
Guardar en un lugar fresco.
No guardar frascos con sobrantes.

Condiciones de almacenamiento:
Guardar en un lugar fresco.

Presentación:
Litro (Cod. 20-473)
Galón (Cod. 20-616)

AMOX PLUS

Antibiótico Expectorante Hidrosoluble.

Composición por litro:
Amoxicilina trihidratada ..... 100 gr.
Eritromicina tiocianato ..... 120 gr.
Bromhexina HCl..... ....5 gr.
Vehículo c.s.p.....1.000 cc.

Acción:
AMOX PLUS contiene dos antibióticos de amplio espectro y un mucolítico actuando en infecciones respiratorias y mejorando la capacidad respiratoria.

Indicaciones:
Infecciones del tracto respiratorio efectivo contra gram positivos y negativos además de micoplasmas.

Administración:
Agua de bebida.

Dosis:
1000 cc de Amox Plus por cada 200 galones de agua.

Duración del tratamiento:
5-7 días.

Contraindicaciones:
No tiene.

Período de suspensión:
7 días.

Precauciones:
No dejar al alcance de los niños.

Condiciones de almacenamiento:
Guardar en lugar fresco.

Presentación:
Litro (Cod. 20-474)
Galón (Cod. 20- 617)

AMOXICILINA

Antibiótico hidrosoluble.

Composición por litro:
Amoxicilina trihidrato..... ..150 gr.
Excipiente c.s.p..... 1000 gr.

Acción:
AMOXICILINA 15% es una penicilina con un amplio espectro de acción. Su uso esta indicada en un amplio rango de enfermedades infecciosas tales como las del tracto respiratorio, infecciones gastrointestinales, tracto urinario, actúa mas rápidamente como bactericida que otras penicilinas, etc.

Indicaciones:
Aves: infecciones por E. coli, infecciones secundarias a continuación de enfermedades virales.

Cerdos: Colibacilosis, salmonelosis, estreptococosis, estafilococosis.

Terneros: gastroenteritis causadas por E. coli y Clostridio perfringens, gastroenteritis y bronconeumonía causada por Salmonela dublin y Salmonella tifimurium, bronconeumonias causada por Pasterela hemolítica y Pasterela multocida.

Administración:
En el agua de bebida o en la leche.

Dosificación:
Aves; 1-2 libras por 250 galones de agua, administrar durante 3-5 días consecutivos. En el alimento 2-4 libras por tonelada.

Cerdos**:** 1-2 libras por 250 galones de agua durante 3-5 días consecutivos En el alimento 2-4 libras por tonelada.

Terneros: 0.5 gramos por 20 libras de peso corporal dos veces al día, administrar en la leche por 3-5 días consecutivos. En el alimento 2-4 libras por tonelada.

Contraindicaciones:
Alergias a la penicilina.

Período de suspensión:
7 días.

Precauciones:
No dejar al alcance de los niños.

Condiciones de almacenamiento:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el calor excesivo y la alta humedad.

Presentación:
Frascos de 1000 gramos (Cod. 20-340)

AVIPIREX

Polvo soluble de uso oral antipirético.

Composición por kilo:
Acido Acetil Salicilico ..... 300 grs.
Vitamina C (acido ascórbico)..... ..50 grs.
Excipiente c.s.p.....1,000 grs.

Acción:
AVIPIREX ayuda a regular la temperatura corporal y tiene acción anti-stress.

Indicaciones:
Como complemento en el tratamiento de enfermedades.
Para combatir el stress calórico por altas temperaturas.
Para la prevención de golpes calóricos y como complemento de enfermedades infecciosas febriles.
Mantiene la calidad de la cáscara.
Para disminuir el stress causado por el dolor y la inflamación después del corte de picos.

Administración:
En el agua de bebida.

Dosificación:
Aves y cerdos 3.3 libras por 400 galones de agua mientras dure la causa.
Precaución:
No tiene.

Contraindicaciones
No debe usarse en gatos, por ser tóxico para estos animales.
No administrar antes del despique.

Periodo de suspensión:
No tiene.

Precauciones:
No dejar al alcance de los niños.

Condiciones de almacenamiento:
Guárdese en un lugar fresco.

Presentación:
Frascos de 1,000 gramos (Cod. 20-550)

BACTEROMICINA

Antibiótico hidrosoluble.

Composición por 200 gramos:
Sulfato de Neomicina..... ..144.40 gr.
Excipiente c.s.p..... .....200 gr.

Acción
NEOMICINA SULFATO,esta indicado en enteritis causada por bacterias Gram negativas entre otras Campylobacter spp. Varias cepas de Salmonellas.

Indicaciones:
En el tratamiento de enteritis bacterianas e infecciones gastrointestinales. En cerdos en los casos de salmonelosis, colibacilosis, leptospirosis y disentería causada por Treponema hyodisenteriae.
En aves en los casos de salmonelosis, colibacilosis e infecciones por estafilococos.
En terneros salmonelosis y enterotoxicosis causadas por E. coli.

Administración:
Disuelto en el agua de bebida.

Dosificación:
•Aves: 1 a 3 sobres por 200 galones de agua por 3 días.
•Cerdos: 1 a 3 sobres por 200 galones de agua por 3 días.
•Terneros: 10-25 mg de sustancia activa por kilo de peso vivo, por 3 a 5 días.

Contraindicaciones:
No tiene.

Período de suspensión:
3 días.

Precauciones:
No tiene.

Condiciones de almacenamiento:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el calor excesivo y la alta humedad.

Presentación:
Sobres de papel de aluminio de 200 gr. (Cod. 20-529)

CIPROFLOXACINA 20%

Antibiótico hidrosoluble.

Composición.
Ciprofloxacina ……..200 mg.
Excipiente c.s.p…….…… 1 ml.

Acción.
CIPROFLOXACINA pertenece al grupo de quinolonas y posee efecto bactericida principalmente contra bacterias Gram negativas tales como Campylobacter, E coli, Haemophilus, Micoplasma, Pastereulla y Salmonella spp.

Indicaciones.
Infecciones gastrointestinales, respiratorias y urinarias provocadas por microorganismos sensibles a la ciprofloxacina.

Administración.
En el agua de bebida

Dosificación.
Aves: 100 ml por 75 a 100 galones de agua
Cerdos: 100 ml por 50 a 150 galones de agua

Precauciones.
Hipersensibilidad a la ciprofloxacina
No administrar a animales con problemas hepáticos o renales.
No administrar en forma simultanea con tetraciclinas, cloramfenicol, macrolidos y licosamidas.

Período de suspensión.
En animales de carne para consumo humano 12 dias.

Condiciones de conservación.
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el calor excesivo y la alta humedad.

Presentación.
Frasco de 1 litro. (código 20-038)

C.S.P-250

Antibiótico y quimioterápico premix.

Composicion por 5 libras:

Penicilina ....50 gr.
Sulfametazina..... ..100 gr.
Clortetraciclina ....100 gr.
Vehículo c.s.p ..... 2270 gr.

Acción:

C.S.P-250 es sumamente efectivo en el tratamiento de disentería porcina (salmonelosis o enteritis necrótica causada por Salmonella choleraesuis y disentería vibrionica). En el tratamiento de neumonías, rinitis atrófica, abscesos.

C.S.P-250 ayuda a mantener la ganancia de peso en épocas de stress, actúa como promotor de crecimiento y mejora la conversión alimenticia.

Indicaciones:

Cerdos: Para el tratamiento de la disentería porcina, neumonías, rinitis atrófica, abscesos

Administración:

Debe administrarse mezclado con el alimento.

Dosis:

5 libras por tonelada de alimento estimula el crecimiento, mejora la ganancia de peso.
5 libras por tonelada de alimento para tratar la disentería porcina, neumonías, rinitis atrófica, abscesos.

Contraindicaciones:

No suministrar junto a otros productos que contengan sulfa.

Período de suspensión:

7 días.

Precauciones:

Debe mezclarse bien en el alimento.

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el calor excesivo y la alta humedad.

Presentación:

Fundas multicapas de papel y plástico de 50 libras.
(Cod. 30-015)

COCCIPROT 20%

Coccidicida hidrosoluble.

Composición por 1 ml:
Amprolium HCL ..... 200 mg.
Excipiente c.s.p..... ....1 ml.

Acción:
Amprolium es un antagonista de la tiamina (vitamina B1) y actúa principalmente en la primera generación de esquizontes. Las coccidias son eliminadas por la deficiencia de tiamina causada por este antagonismo, inhibiendo la diferenciación de los merozoitos y la esporulacion de los oocitos.

Indicaciones:
COCCIPROT esta indicado para el tratamiento de la coccidiosis en las direfente especies, especialmente en aves.

Administración:
En el agua de bebida de los animales.

Dosificación:
Aves: 0.6-1.2 litros por 250 galones de agua por 5-7 días (120 cc a 240 cc por 50 galones.
Ovinos y bovinos 25 ml por cada 100 kg. de peso vivo.

Contraindicaciones:
No tiene.

Período de suspención:
No tiene.

Precaución:
Para evitar síntomas de la deficiencia de vitamina B1 por el uso de este fármaco, se recomienda evitar dosificaciones que pasen el 0.50% de Amprolium a menos que se incremente la gravedad de la infección.

Condiciones de almacenamiento:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el calor excesivo y la alta humedad.

Presentación:
1 Litro (Cod. 20-512)

COCCIVET 25%

Coccidicida premix.

Composición 1 kilo:
Metil clorpindol (3,5 dicloro 2,6 dimetil-4 piridinol . 250 gr.
Excipiente c.s.p..... 1000 gr.

Acción:
COCCIVET PREMIX 25% es un activo coccidicida para incorporar en los alimentos balanceados de las aves. Su principio activo actúa eficazmente sobre la primera fase asexual de las coccidias: esporozoitos, alojados en el interior de las células de la mucosa intestinal, con lo cual se detiene el ciclo vital del parásito en una etapa en la que es incapaz de producir lesiones y trastornos típicos de la coccidiosis.
COCCIVET PREMIX 25% evita las lesiones generalizadas, permitiendo una mayor función asimilativa de la mucosa intestinal, lo que se traduce en un mayor índice de conversión, mayor peso y más uniformidad en el desarrollo. Es atoxico, tiene un amplio margen de seguridad, y es compatible con antibióticos y mezclas vitamínico-minerales.

Indicaciones:
COCCIVET PREMIX 25% esta indicado en la prevención y control de la coccidiosis cecal e intestinal de las aves. Es altamente eficaz contra todas las coccidias patógenas: Eimeria necatrix, E.tenella, E. máxima, E.acervulina y E. brunetti.

Administración:
Mezclado en el alimento de las aves.

Dosificación:
Mezclar 1 libra de COCCIVET PREMIX 25% por tonelada de alimento. De esta manera el principio activo Metil Clorpindol queda en una proporción de 125 ppm, o 125 gr por tonelada de alimento.
Bajo condiciones de extrema exposición, se sugiere la dosis de 2 libras por tonelada de alimento.
Para tratamiento: 2-3 libras de COCCIVET PREMIX 25%, dependiendo de la severidad de la enfermedad, por cada tonelada de alimento. Duración del tratamiento 4 días después de desaparecer los síntomas.

Pollos de Engorde: Debe suministrarse en forma continua desde el primer día hasta 5 días antes de su sacrificio.
Pollas de recría: Debe suministrarse desde el primer día de vida hasta 3 semanas después de haber sido alojadas en las jaulas.

Contraindicaciones:
No tiene.

Período de suspención:
5 días.

Precauciones:
No debe usarse en pollas de reemplazo que tendrán su ciclo de producción en piso.

Condiciones de almacenamiento:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el calor excesivo y la alta humedad.

Presentación:
Fundas de papel multicapas de 25 Kg. (Cod. 20-107)

COLISTINA 10%

Antibiótico hidrosoluble.

Composición.
Colistina (sulfato)……..……..10 gr.
Excipiente c.s.p.……..…….. 100 gr.

Acción.
COLISTINA 10% es un antibiótico polipeptidico perteneciente a la familia de las polimixinas para ser usado en aves, cerdos y terneros. Es un tenso activo catiionico que interacciona con los fosfolipidos de la membrana alterando la permeabilidad y ocasionando la muerte de la bacteria.

Indicaciones.
Para la prevención y tratamiento de las diarreas causadas por E. Coli Salmonella spp en porcinos, aves y terneros.

Administración
En el agua de bebida

Dosificación.
En todas las especies se administra en la misma dosificación: Agua de bebida 500 gr de COLISTINA 10% en 250 galones de agua. En el alimento 2 libras por cada 20 quintales. Duracion del tratamiento 5 a 7 dias según criterio del Medico Veterinario.

Precauciones.
No administrar a rumiantes adultos ni a aves en postura.

Período de suspensión.
No tiene.

Condiciones de conservación.
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el calor excesivo y la alta humedad.

Presentación.
Fundas de 50 libras. (código 20-036)

DAIRY IODUM

Desinfectante –Germicida-Detergente.

Composición porcentual:

Complejo de Iodo 15%
Iodo disponible.....1.75 % (17.500 ppm)
Ácido Fosfórico..... .....5%
Ingredientes inertes 80%

Acción:

IODO VETERINARIO-20 es un desinfectante yodóforo liquido con 1.75% de yodo activo unido a una molécula tenso activa de eficaz poder detergente y de penetración. Es de amplio espectro de acción sobre bacterias Gram positivas y negativas, hongos y virus, lo que unido a su efecto sobre grasas, enzimas y otras proteínas, le confiere además poder desodorizante.

Indicaciones:

Para desinfectar superficies como paredes, mesones, pesos, equipos y utensilios en: industrias de alimentos, industrias agropecuarias, mataderos, vehículos de transporte, etc.

Administración:

Se puede usar en soluciones en forma directa o con bomba fumigadora.

Dosificación:

• Para desinfectar superficies y material de trabajo en: industria de alimentos, planteles agropecuarios, plantas lecheras:
1 litro de IODO VETERINARIO-20 por 50 galones de agua (3.5-4 onzas por cada 5 galones de agua).

• Para desinfectar superficies altamente contaminadas:
1.3 litros de IODO VETERINARIO-20 por 50 galones de agua (3.5 onzas por 5 galones de agua).

• Para desinfección de agua de bebida:
2.5 onzas de IODO VETERINARIO-20 por 50 galones de agua (1 onza por 20 galones).

• Para desinfección de equipos de lechería:
5 onzas de IODO VETERINARIO-20 por 50 galones de agua (1/2 onza por cada 5 galones)

Contraindicaciones:
No tiene.

Período de suspención:
No tiene.

Precauciones:
No mezclar IODO VETERINARIO-20 con otros detergentes, jabones ni productos clorados.
El producto debe diluirse en agua fría o tibia, siempre que no sobrepase una temperatura de 40 grados Celsius, para evitar la volatilización del yodo.

Condiciones de conservación:
Mantener el envase bien cerrado.
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el calor excesivo y la alta humedad.

Presentación:
Galón (Cod. 20-504)
55 galones (Cod. 20-352)

DOXICICLINA 10%

Antibiótico hidrosoluble.

Composición por 1 ml:
Doxiciclina (Hiclato).....100 ml
Excipiente c.s.p.……...… 1 ml.

Acción
Doxiciclicna 10% es activa contra bacterias Gram negativas Pasteurella, E. Coli y Salmonella. Baterias Gram Positivas Staphylococcus Aureus, Strepotococcus Spp. Algunos anaerobios como Clostridium Spp, Micoplasma Spp. Otros como Rickettsias, clamidias y algunos protozoos

Indicaciones
Aves: Colibacilosis, CRD y Micoplasmosis.

Cerdos: Problemas respiratorios producidos por: Pasteurella, Bordetella y micoplasma.

Administración
En el agua de bebida.

Dosificación.
Aves; 100 a 200 ml por 50 galones de agua, de bebida por 3 a 5 días

Cerdos: 1 ml por 10 kilos de peso vivos por día

Condiciones de conservación.
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el calor excesivo y la alta humedad.

Período de suspensión.
En aves 5 días antes del sacrificio.
En cerdos 7 días.

Presentación.
Frascos de 1 litro. (Cod. 20-042)

ENRO-10

Antibiótico hidrosoluble.

Composición por 1 ml:
Enrofloxacina ..... 100 mg.
Excipiente c.s.p..... ....1 ml.

Acción:
ENRO-10, es una quinoloma de tercera generación, de una amplia acción antibacteriana, la cual esta basada en la inhibición de la DNA girasa, enzima fundamental para la multiplicación bacteriana. Destruye directamente el acido desoxiribonucleico. Tiene una excelente cinética, es de fácil absorción, inmediata difusión, mayor concentración en tejidos y máximo nivel terapéutico en la hora.

Indicaciones:
En aves: Tiene amplio espectro de acción, siendo efectivo para combatir tanto gérmenes gram positivos, como gérmenes gram negativos y micoplasmas. Es un producto de elección para tratar los siguientes cuadros: Enfermedad Crónica Respiratoria Complicada, Colisepticemina, Salmonelosis, Coriza, Cólera aviar, etc.

Administración:
En el agua de bebida de las aves.

Dosificación:
ENRO-10 debe calcularse una dosificación en base a peso vivo de 10 mg. por kg. de peso vivo ó 1 ml. por cada 2 litros de agua (100cc por cada 50 galones).

Contraindicaciones:
No tiene.

Período de suspensión:
7 días.

Precauciones:
ENRO-10 es un producto de muy baja toxicidad, debe tenerse presente que su uso indiscriminado puede producir resistencia de los microorganismos, por lo cual debe usarse en la dosis recomendada.

Condiciones de almacenamiento:
Almacene el producto a temperatura ambiente evitando el calor excesivo y la alta humedad.
Mantener los envases bien cerrados.

Presentación:
Litro (Cod. 20-005)

ERITRO PLUS

Antibiótico hidrosoluble.

Composición por frasco:
Tiocianato de Eritromicina..... 240 gr.

Acción:
ERITROMICINA SOLUBLE tiene acción bacteriostática. Su espectro de acción incluye Gram positivos y numerosas bacterias Gram negativas. Es activa contra Estreptococos y Estafilococos, Actinobacilos, Pasteurela spp, Bordetela spp, Campilobacter, Leptospira Pomona y Clostridios.

Indicaciones:
En aves para la prevención y tratamiento de la Enfermedad Crónica Respiratoria, tratamiento de Coriza Infecciosa, tratamiento Cresta Azul. Infecciones por micoplasma.
En cerdos para tratar las infecciones por Estreptococos, Estafilococos, Micoplasma.

Administración:
En el agua de bebida.

Dosificación:
Curativo: un frasco por 200 galones de agua por 5 días
Preventivo: un frasco por 400 galones de agua por 5 días.

Contraindicaciones:
No tiene.

Período de suspensión:
7 días.

Precauciones:
Usar en la dosis indicada y por los períodos establecidos para evitar resistencia bacteriana.

Condiciones de almacenamiento:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el calor excesivo y la alta humedad.

Presentación:
Frascos de 240 gr. (Cod. 20-320)

FLORFENICOL 10%

Antibiótico hidrosoluble.

Comoposición.
Florfenicol……..100 gr.
Excipiente c.s.p…… 1000 gr.

Acción.
FLORFENICOL 10% es un antibiótico sintético de amplio espectro recomendado para el tratamiento de las infeccione bacterianas mas comunes de los animales, especialmente el control de infecciones por E.coli, Pasteurella Multocida, en pollos de engorde y pollitas de reemplazo tanto de reproductoras como de gallinas de postura comercial y Haemophilus Parasuis, Actinobacillus Pleuroneumoniae, Streptococus suis en cerdos de destete y engorda.

Indicaciones.
Aves: infecciones por E coli y otras bacterias susceptibles a este antibiótico.

Cerdos: indicado en el tratamiento del síndrome respiratorio porcino causado por Streptococcus suis, Haemophilus parasuis, pasteurella multocida, Actino bacillus pleuropneumoniae.

Administración. En el agua de bebida

Dosificación. Aves: administar 200 ml por 50 galones de agua.

Cerdos: debe administrarse en el agua de bebida a razón de 50 a 100 ml de producto por cada 25 galones, durante 5 dias.

Precauciones.
El producto puede causar leve diarrea en los lechones que se controlara con la suspensión del tratamiento.
No se recomienda preparar una solución madre ya que puede formar precipitados.

Período de suspensión.
Cinco días antes del sacrificio de animales destinados al consumo humano.
No administrar en gallinas en produccion

Condiciones de conservación.
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el calor excesivo y la alta humedad.

Presentación: Frascos de un litro (código 20-037)

FORTALIN

Concentrado proteico, aminoácidos y promotores, para emplearse en gallinas que han tenido un descenso de la postura por razones de stress. Pollos de engorde retrasados en su desarrollo.

Análisis del producto:
Proteína: 40% mínimo
Metionina: 4% mínimo
Lisina: 1% mínimo
Fósforo: 2% mínimo

Características del producto:
Producto en harina con un alto nivel de proteínas, destacándose las proteínas de origen animal (harina de pescado). A lo anterior se agregan aminoácidos como metionina y lisina que ayudarán aún más a la síntesis de proteínas en el ave.

Un nivel adecuado de fósforo disponible mejorará síntesis de cáscara de los huevos

Cuando usar el producto:
En los casos que gallinas en plena etapa de producción hayan bajado de los niveles normales, unido a disminución del apetito. La menor ingesta de alimento significará una disponibilidad menor de proteínas y aminoácidos cada día resintiéndose la producción de huevos.

Al adicionar éste concentrado al alimento normal de postura, estaremos incrementando el porcentaje de proteínas y aminoácidos de los que puede disponer la gallina, agregándose a esto que partes de las proteínas extras que le estamos proporcionando son de origen animal, de una digestibilidad mayor que las vegetales.

En el caso de pollos de engorde retrasados, el consumo de una proteína de alta calidad mejorara su condición general y peso.

Dosis:
Agregar 25 libras por cada 20 quintales de alimento, si se quiere cuadrar exacto en los 20 quintales disminuir 25 libras de maíz.

Puede ser usado como un top feed, es decir ponerlo por sobre el alimento en los comederos, dejando una capa de este producto sobre el alimento comercial.

Contraindicaciones:
No usar junto con Furazolidona.

Período de suspensión:
7 días.

Posibilidades de intoxicación:

Son prácticamente nulas, ya que para que alguno de los elementos que lo forman sean tóxicos deberían ser el alimento único de las aves.

Incompatibilidades:
No tiene ninguna incompatibilidad con otras materias primas o aditivos.

Presentación:
Fundas de 50 libras, con dos dosis de 25 libras cada una.
(Cod. 20-210)

FOSFOMICINA PLUS SULUBLE

Antibiótico hidrosoluble

Composición.
Fosfomicina Calcica…….....20 gr.
Tilosina……..…….. 5 gr.
Vehiculo c.s.p.……100 gr

Acción.
FOSFOMICINA poderoso antibiótico producido a partir del Streptomyces fradiae ejerce una acción especifica sobre la pared celular bacteriana, bloquendo la biosíntesis de importantes elementos estructurales y promoviendo la desintegración de la bacteria al hacerla perder su presión osmótica interna, de allí su acción bactericida. La TILOSINA es un bacteriostático y se le utiliza con éxito en el tratamiento de enfermedades causadas por micoplasma.

Indicaciones
Complejo antibiótico contra infecciones causadaspor germenes gramnegativos, grampositivos y ciertas especies de micoplamas, clamidias, colibacilosis, ERC, coriza, tifosis, cólera aviar listeriosis,infecciones stafilococicas.

Administración
En el agua de bebida.

Dosificación.
FOSFOMICINA PLUS SOLUBLE 160 mg/kg de peso vivo durante 3 a 7 dias.Se puede usar a la misma dosis en el alimento.

Precauciones.
No administrar a aves productoras de huevos de consumo humano.
Usar dentro de los 7 días de mezclado el alimento.

Período de suspensión.
Suspender el tratamiento 7 días antes del sacrificio.

Condiciones de conservación.
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el calor excesivo y la alta humedad. (10ª 25 grados C).

Presentación.
Fundas de 50 libras. (código 20-039)

HEPATOPROT

Protector hepático.

Composición por un litro:

Magnesio	1500 mg.
Zinc	1500 mg.
Manganeso	6 gr.
Hierro	1500 mg.
Cobre	300 mg.
Complejo B	100 gr.
Cobalto	30 mg.
Selenito	12 mg.
Fósforo	85 gr.
Enrofloxacina	1500 mg.
Propilenglicol	600 gr.
Sodio	36 gr.
Vehiculo c.s.p	1000 cc.

Acción:
Diferentes estudios han demostrado que las aves afectadas por hepatitis por cuerpos de inclusión tienen una mejor y mas rápida recuperación cuando reciben minerales y vitaminas que se depositan en el hígado y esta acción es mejorada por la presencia de un antibiótico como la enrofloxacina.

Indicaciones:
Aves afectadas por Hepatitis por Cuerpos de Inclusión.

Administración:
Disuelto en el agua de bebida.

Dosificación:
1000 cc por 50 galones de agua.

Contraindicaciones:
No tiene.

Período de suspensión:
5 días.

Precauciones:
No dejar al alcance de los niños.

Condiciones de almacenamiento:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el calor excesivo, mantener los envases bien cerrados.
No guardar envases abiertos.

Presentación:
1 Galón (Cod. 20-507)

HIDRO-VI AD3E+C

Vitaminas hidrosolubles.

Composición:

Por ml:

Vitamina A..... 50,000 UI.
Vitamina E.....30 UI.
Vitamina D3 .....5,000 UI.
Vitamina C.....100 Mg.

Acción:

HIDRO-VI AD3E+C esta orientado a poder contar con una fuente rica de vitaminas liposolubles. Hay un especial interés en que los animales que normalmente están sometidos a explotaciones intensivas puedan en ciertos momentos disponer de un producto que les permita corregir problemas s causados por deficiencias de estas vitaminas. Su deficiencia se manifiesta por alteraciones del aparato respiratorio, digestivo, reproductor, raquitismo, cáscara débil de los huevos, encéfalomalacia, etc.

Indicaciones:

HIDRO-VI AD3E+C se recomienda para estimular la producción, cuando hay Síndrome de Mala Absorción, en casos de encéfalomalacia, en animales con raquitismo, deficiencias del crecimiento, para ayudar en enfermedades respiratorias y digestivas, especialmente diarreas.

Animales sufriendo de stress por calor y afectados por enfermedades especialmente respiratorias.

Administración:

Disuelto en el agua de bebida.

Dosificación:

Aves:

Pollitas hasta 2 meses de edad: 1 litro por 10.000 aves en el agua de bebida durante 3 días.

Pollos de engorde: 1.5 litros por 10.000 aves en el agua de bebida durante 3 días.

Gallinas de postura: 3 litros por 10.000 aves en el agua de bebida durante 3 días.

Cerdos:

Lechones: 2 ml por animal durante 3 días.

Cerdos adultos: 3 ml por animal durante 3 días.

Este producto debe darse en forma de “choque”, una vez que los animales se han tomado la dosis diaria seguir dando agua solamente.

Contraindicaciones:
No dar en forma conjunta con producctos que tengan alto contenido de vitamina D3.
Período suspensión:
No tiene.

Condiciones de almacenamiento:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el calor excesivo y la alta humedad.
Mantener los envases bien cerrados.
No guardar envases abiertos.

Presentación:
Litro (Cod. 20-217)
Galón (Cod. 20-221)

IVERMEK PLUS

Antiparasitario externo e interno para aves.

Composición por 100 gramos:
Ivermectina ……..1.02 mg.
Excipiente c.s.p…….. ... 100 gr.

Acción:
Actúa sobre parásitos internos y externos en aves. Reduce la población de escarabajos.

Indicaciones:
Parasitosis internos:
Causadas por Ascaria spp y Capillaria spp.
Parasitosis externos:
Causadas por ácaros y piojos
Control del escarabajo de la cama (Alphitobius diaperinus)

Administración:
En el agua de bebida de las aves.

Dosificación: 2 días
Con el objeto de lograr la dosificación indicada, debe diluirse el producto de la siguiente manera:
Parasitosis interna, externa y escarabajos: 1ml por cada 25 kg de peso.

La cantidad del producto que debe recibir la parvada, será el resultado del peso promedio de las aves en kilos, multiplicando por el total de la misma y dividido entre 25.

Contraindicaciones:
No tiene.

Período de suspención:
No tiene.

Recomendaciones:
Para asegurar que todas las aves consumirán todo el medicamento debe restringirse el agua por dos horas y diluir el producto en la cuarta parte del consumo total de agua del día.

Para los casos de fuertes infestaciones se recomienda repetir el tratamiento a los 14 días, especialmente cuando se trata de parásitos externos.

Precauciones especiales:
Una vez mezclado el producto en el agua debe ser administrado en las 12 horas siguientes.

Condiciones de conservación:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el calor excesivo y la alta humedad, Fuera del alcance de los niños.

Presentación:
1 Litro (Cód 20-006)

LINCOMICINA-50

Premezcla antibiótica para el alimento.

Composición por kilo:
Lincomicina HCl .....50 gramos
Vehículo c.s.p .....1.000 gramos

Acción:
Su acción antibiotíca actúa sobre la flora intestinal, mejora la sanidad del intestino y al disminuir el grueso de la pared del tubo digestivo mejora la absorsión.

Indicaciones:

Para mejorar la ganancia de peso de los animales, para mejorar la eficiencia alimenticia, y para el control de enteritis necrótica causada o complicada por Clostridium spp. u otros microorganismos susceptibles a la Lincomicina en broilers.

Para el tratamiento y control de la disentería porcina, para reducir la severidad de la neumonía por micoplasma en cerdos.

Dosis:
Cerdos Prevención: Disentería porcina 2 libras por tonelada.
Neumonía micoplasmica: 1 libra a 4 libras por tonelada.
Aves:
Tratamiento: Disentería porcina 5 libras por tonelada por 21 días y continuar con 2 libras hasta la venta.

Neumonía Micoplasmica: adicionar 2 a 4 libras por tonelada por 21 días.
Enteritis necrótica en aves 5 libras por tonelada de alimento por 10 días.

Período de suspensión:
7 días.

Vía de administración:
Alimento.

Contraindicaciones:
No tiene.

Recomendaciones:
No dejar al alcance de los niños.
Guardar en un lugar fresco.

Condiciones de almacenamiento:
Lugar seco evitando el calor exesivo.

Presentación:
Fundas de 55 libras (Cod. 30-095)

MADURAMICINA

Coccidicida para el alimento.

Composición
Maduramicina Amonio ....10 gr.
Excipiente c.s.p..... 1000 gr.

Acción:
Maduramicina es activa durante las primeras fases del ciclo de vida de la coccidia. Los Iones monovalentes, como el sodio y el potasio, son transportados por el antibiótico al interior del parasito, ocasionando desequilibrios iónicos en el interior de la célula. Es un coccidicida que mata el parasito en el huésped, mientras que los coccidiotatos solo inhiben el desarrollo del parasito ante la presencia del fármaco.

Indicaciones:
Esta indicado en la prevención de coccidiosis en aves causadas por las especies de Eimeria; Acervulina, Brunetti Máxima, Mitis, Mivati, Necatrix, Tenella.

Administración:
Mezclado en el alimento de las aves.

Dosificación:
1 libra por cada 20 QQ de Alimento.

Contraindicaciones:
No tiene.

Periodo de suspensión:
72 Horas

Precauciones especiales:
No debe usarse en pollas de reemplazo que tendrán su ciclo de producción en piso.

Condiciones de almacenamiento:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el calor excesivo y la alta humedad, Fuera del alcance de los niños.

Presentación:
Fundas multicapas de papel y plástico de 50 libras.
(Cod. 20-407)

MICOTYL

Antibiótico hidrosoluble.

Composición por 100 gramos:
Tilosina Tartrato ..... 100 gr.

Acción
Micotyl es un antibiótico de gran eficacia en la prevención, control y tratamiento de enfermedades producidas por el Micoplasma gallisepticum o el Micoplasma gallinae. En infecciones respiratorias en vacunos y cerdos causadas por micoplasmas, logrando un buen rendimiento en los animales tratados.

Indicaciones:
• Aves: Tratamiento preventivo y curativo de la Enfermedad Crónica Respiratoria (CRD) de etiología Micoplasmica en pollos de engorde y pollitas de reposición. Aerosaculitis. Factor anti stress en etapas de vacunación. Sinusitis infecciosa del pavo en todas sus formas.
• Cerdos: Como preventivo en la neumonía enzoótica y tratamiento de la disentería porcina.
• Terneros: prevención y curación de neumonías producidas por Micoplasmas sensibles a la tilosina.

Administración:
En el agua de bebida o en la leche para los terneros.

Dosificación:
Pollos uso preventivo: 1 frasco por 50 galones de agua los tres primeros días de vida, repetir por un día a la tercera y cuarta semana.
Uso curativo:
Tratar por 3 a 5 días según el grado de la enfermedad.

Pollas de Reemplazo Ponedoras y Reproductoras: un frasco por 50 galones de agua los tres primero dias de vida. Repetir por uno o dos días después de cada vacunación o en condiciones de stress de las aves
Tratar por tres o cinco días según el grado de la enfermedad.

Pavos: un frasco por 50 galones de agua, los tres primeros dias de vida. Repetir por dos días a la cuarta semana.
Tratar por tres o cinco días según el grado de la enfermedad.

Cerdos: un frasco por 100 galones de agua.
Por 3-8 días como prevención de la neumonía enzoótica.
Dar por 8 días y como mínimo hasta un día después que pase la diarrea.
Terneros: un gramo de Tartrato de Tilosina dos veces al día por una o dos semana.

Contraindicaciones:
No tiene.

Período suspensión:
7 días.

Precauciones:
Disolver en un envase limpio antes de colocarlo en los tanques de agua de bebída.

Condiciones de conservación:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el calor excesivo y la alta humedad.

Presentación:
Frascos de 100 gr. (Cod. 20-305)

MIXOLIGO PLUS

Complemento nutricional liquido.

Composición por litro:

Fósforo	140 gr.
Calcio	20 gr.
Sodio	45 gr.
Magnesio	10 gr.
Zinc	2.500 mg.
Manganeso	2500 mg.
Hierro	2.500 mg.
Cobre	500 mg.
Cobalto	50 mg.
Selenio	20 mg.
Excipiente c.s.p.	1 litro.

Acción:

MIXOLIGO PLUS aporta todos los minerales más importantes para un buen desarrollo de los animales, así como para mantener niveles de producción óptima. En el campo es frecuente encontrar por razones diferentes, animales que son afectados por cuadros carenciales relacionados con el mal aporte de minerales que están recibiendo. Sin un correcto nivel de minerales en la dieta tendremos un conjunto de alteraciones nutricionales que irán desde problemas de mineralización de los huesos, retardo en el crecimiento, anemia, dermatosis, paraqueratosis, etc.

Indicaciones:

MIXOLIGO PLUS esta recomendado en casos de síntomas de deficiencia causados por niveles inadecuados de minerales tanto en aves, cerdos y ganado vacuno. Mejora fertilidad, lactación y crecimiento en ganado. Suplemento cuando los pastos son pobres en minerales.

Administración:

En el agua de las aves, cerdos y ganado vacuno o mezclado con el alimento.

Dosificación:
Aves: 1 ml por litro de agua de bebida.
Cerdos: Adultos: 5-10 ml diluidos en un litro de agua de bebida.
Lechones: 5 ml diluidos en 1 litro de agua de bebida.
Ganado Vacuno: 8-12 ml diluidos en un litro de agua de bebida.
Darlo por 4-6 días de cada mes.

Contraindicaciones:
No tiene.

Período suspensión:
No tiene.

Precauciones:
Nunca administrarlo puro, siempre diluido.

Condiciones de conservación:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el calor excesivo y la alta humedad.
Mantener los envases bien cerrados y protegidos de la luz.

Presentación:
1 litro (Cod. 20-334)
2.5 litros (Cod. 20-335)

MUCOBROM

Expectorante hidrosoluble.

Composición por litro:
Bromhexina HCl..... .....5 gr.
Eucaliptol ....10 gr.
Vehículo c.s.p..... 1.000 cc.

Indicaciones:
MUCOBROM es una benzilamina con propiedades expectorantes. Se usa sola para el tratamiento de enfermedades respiratorias donde existe una dañada capacidad mucociliar acompañada de abundantes secreciones viscosas. Es un coadyuvante en los tratamientos con antibióticos y quimioterapicos en problemas respiratorios. Actúa como mucolitico y secretolitico, facilitando la expectoración. Descongestionante de la traquea, bronquios, pulmones y todo el tracto respiratorio. Se absorve rapidamente en el intestino, distribuyéndose en el organismo por via sanguínea.

Vía de administración:
Agua de bebida.

Dosis:
100 cc por cada 50 galones de agua por 5-7 días.

Contraindicaciones:
No tiene.

Período suspensión:
No tiene.

Recomendaciones:
No dejar al alcance de los niños

Condiciones almacenamiento:
No exponer al calor, lugar seco.
Guardar en un lugar fresco.
No guardar frascos con sobrantes.

Presentación:
1 Litro (Cod. 20-472)
Galón (Cod. 20-615)

NEUMOSTOP

Asociación antibiótica para el alimento.

Composición:
Clortetraciclina 5% minimo
Lincomicina 6% minimo

Indicaciones:
NEUMOSTOP esta indicado en infecciones producidas tanto por gérmenes gram positivos como gram negativos, de acción intestinal y también para otros tipos de infecciones especialmente respiratorias.

De elección en los tratamientos de problemas respiratorios en aves y cerdos.

Su uso en el alimento permite reforzar los tratamientos vía agua de bebida que normalmente se hacen en aves para enfermedades respiratorias.

Dosis:
15 libras por cada 20 quintales.

Duración tratamiento:
15 días.
Vía de administración:
Alimento.

Contraindicaciones:
No tiene.

Período de suspención:
5 dias.

Precauciones especiales:
Vigilar que el mezclado se haga en forma correcta.

Condiciones de almacenamiento:
Almacenar el producto a temperatura ambiente, evitando el calor excesivo y el exceso de humedad.

Presentación:
Fundas de 45 libras, divididas en tres envases de 15 libras cada uno. (Cod. 30-210)

NUTRACUR SOBRES

Antihelmíntico.

Composición por gramo:
Fenbendazol……..0.222 gr.
Excipiente c.s.p…… 1 gr.

Acción:
NUTRACUR SOBRES es un antihelmíntico de amplio espectro, de acción contra larvas, adultos y huevecillos gastro intestinal, pulmonar y renal del ganado porcino, equino y vacuno.

Indicaciones:
En ganado porcino, equino, vacuno, ovino y caprino como antiparasitario que actúa tanto en estados maduros como inmaduros.

Administración:
Mezclado en el alimento del ganado. La dosis indicada se administra una sola vez. Debe repetirse el tratamiento periódicamente.

Dosificación:
Vacunos y porcinos 5 mg de sustancia activa por kilo de peso.
Medio sobre es suficiente para un vacuno de 200 Kg de peso.
Un sobre para un vacuno de de 400 Kg de peso.
Ovinos: 50 Kg peso, un sobre para cuatro animales.

Contraindicaciones:
No tiene.

Período de suspención:
No tiene.

Precauciones especiales:
No tiene.

Condiciones de almacenamiento:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el calor excesivo y la alta humedad.

Presentación:
Sobres de papel de aluminio de 10 gr. (Cód. 30-041)

NUTRACUR

Antihelmíntico.

Composición por gramo:
Fenbendazol ..... 0.040 gr.
Excipiente c.s.p..... .....1 gr.

Acción:
NUTRACUR es un antihelmíntico de amplio espectro, de acción contra larvas, adultos y huevecillos gastrointestinales, pulmonar y renal del ganado porcino así como todos los parásitos importantes de las aves tales como Ascaridia, Heterakis, Capillaria y tenias.

Indicaciones:
Aves y cerdos: antihelmíntico.

Administración:
Mezclado en el alimento.

Dosificación:
Aves:

Para eliminar Ascaridia, Heterakis, Capillaria 3 libras por tonelada de alimento por 3 días.
Para eliminar tenias 5 libras por tonelada de alimento por 3 días.
Para tratamiento continuo 150 gramos por tonelada de alimento.

Cerdos:
Para eliminar Trichuris suis, Metastrongillus o Sthephanurus dentatus dosis 1 libra por tonelada de alimento durante 6 días.
Para eliminar parásitos gastrointestinales dosis única de 5 libras por tonelada de alimento.

Contraindicaciones:
No tiene.

Período suspención:
No tiene.

Precauciones especiales:
No tiene.

Condiciones de almacenamiento:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el calor excesivo y la alta humedad.

Presentación:
Fundas multicapas de papel y plástico de 2.5 Kg. (Cod. 30-040)
Fundas multicapas de papel y plástico de 5 Kg. (Cod. 30-039)
Fundas multicapas de papel y plástico de 20 Kg. (Cod. 30-038)

NUTRIDAZOL

Quimioterápico para alimentos de cerdos y pavos.

Composición por kilo:
Dimetridazol ....100 gr.
Vehículo c.s.p ..... 1.000 gr.

Acción:
NUTRIDAZOL tiene una marcada efectividad en la prevencion y tratamiento de problemas digestivos en el cerdo, destacándose su acción contra Histomonas, Tricomonas, Balantidium.
NUTRIDAZOL es altamente efectivo contra la Histomona meleagridis, causante de la Histomoniasis en las aves (cabeza negra)

Indicaciones:
Como preventivo y curativo de la Disentería porcina y la Cabeza Negra de los pavos.Tambien tiene acción como promotor del crecimiento y activador de la conversión alimenticia.

Administración:
Debe administrarse mezclado con el alimento.

Dosis:
Cerdos:
1 libra por tonelada de alimento estimula el crecimiento y mejora la ganancia de peso.

2 libras por tonelada de alimento para curar la disentería.

Pavos:
2 a 3 libras por tonelada de alimento para prevenir la cabeza negra.

6 a 12 libras por tonelada de alimento para curar la cabeza negra.

Contraindicaciones:
No tiene.

Período de suspención:
5 días.

Precauciones:
No debe suministrarse a gallinas de postura.

Condiciones de almacenamiento:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el calor excesivo y la alta humedad.

Presentación:
Fundas multicapas de papel y plástico de 50 libras.
(Cód. 30-011)

PENICILY + ESTREPTO

Antibióticos hidrosolubles.

Composición por100 gramos:
Sulfato de estreptomicina ..... 60,000 mg.
Penicilina G Procainica .....20,000,000 UI.
Excipiente c.s.p ..... 200 gr.

Acción:
PENICILINA Y ESTREPTOMICINA soluble es un concentrado estabilizado de antibióticos solubles en agua y de máxima absorción a nivel intestinal.
La combinación antibiótica de Penicilina y Estreptomicina dan un amplio espectro de acción antibacteriano.

Contraindicaciones:
No tiene.
Período de suspensión:
7 días.

Precauciones especiales:
No tiene.

Indicaciones:
Tratamiento de enfermedades producidas por gérmenes sensibles a la Penicilina y a la Estreptomicina.
Ayuda a combatir el stress.
Controla las enfermedades respiratorias.
Producto de elección para tratar la Coriza Infecciosa de las aves y la Dermatitis Gangrenosa.

Administración:
En el agua de bebida.

Dosificación:
Aves:
Preventivo: ½ sobre por 200 galones de agua por 5 días.
Curativo: 1 sobre por 200 galones de agua por 5 días.

Condiciones de almacenamiento:
Mantener el envase bien cerrado.
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el calor excesivo y la alta humedad.

Presentación:
Sobres de papel de aluminio de 200 gr. (Cod. 20-573)

SULFA + TRIMETOPRIM

Antibiótico, quimioterápico hidrosoluble.

Composición por frasco:
Sulfametazina..... 336 gr.
Trimetoprim..... ..67 gr.

Acción:
SULFA +TRIMETOPRIM esta indicado en el tratamiento de un gran numero de infecciones bacterianas del tracto respiratorio, el tracto urinario, el tracto gastrointestinal y el tracto genital. Existe un efecto sinérgico entre SULFA y TRIMETOPRIM, siendo el efecto conjunto superior al que se puede esperar si se dieran en forma independiente.

Indicaciones:
• Aves: Para el tratamiento de coriza infecciosa, cólera aviar, pullorosis y otras enfermedades producidas por gérmenes susceptibles a estos antibióticos.

• Cerdos: Para el tratamiento de salmonelósis, pasteurelósis, colibacilósis. Prevención y tratamiento del complejo MMA.

• Vacunos: Para el tratamiento de salmonelósis, pasteurelósis, colibacilósis, infecciones causadas por Listeria, actinomicósis, mastítis stafilocócica.

Administración:
En el agua de bebida o en la leche para los terneros.

Dosificación:
• Aves: 1 frasco en 200 galones de agua darlo por dos días continuos, descansar un día y dar nuevamente por un día.

• Cerdos: 1 frasco por 200 galones de agua, si hay problemas de consumo por mala palatabilidad, darlo en el alimento a razón de 1 libra por tonelada de alimento por 5 a 7 días.

• Vacunos: calcular la dosis a razón de 0.1 g por kilo de peso vivo. Darlo en la leche o en el agua de bebida. Se puede usar pistola dosificadora o con botella. Repetir la dosificación por 3-5 días o 1 día después que los síntomas hallan pasado.

Presentación:
Frascon de 403 gramos.

Contraindicaciones:
No usar junto a otros productos que contengan sulfa.

Período suspensión:
7 días.

Precauciones:
No exceder los plazos de tratamiento y la dosis indicada.

Condiciones de almacenamiento:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el calor excesivo y la alta humedad.

Presentación:
Frascos de 400 grm. (Cod. 20-307)

TEKTROL

Desinfectante, limpiador concentrado.

Composición:

Orto-fenilfenol..... 12.0 %
Orto-Benzil-para-clorofenol..... 10.0 %
Para-terciario-Amilfenol..... ..4.0 %
Ingredientes inertes. ..... 74.0 %

Acción;

TEKTROL es un detergente sintético con un amplio espectro de eliminación de microorganismos Gram. Positivos y Gram. Negativos. Permite limpiar y desinfectar eficientemente en una sola operación. Actúa sobre estafilococos, pseudomonas, salmonelas, aspergilos, virus, hongos, es desodorante y biodegradable.

Indicaciones:

Este producto esta especialmente formulado para poder hacer limpieza pesada, emulsionando, humectando y penetrando en la materia orgánica y en la suciedad.

Administración:

Diluido en el agua de lavado. Por aspersión, nebulización y en forma de aerosol.

Dosificación:

Dosis única 4 ml por litro de agua o un galón por 250 galones de agua.

Proporciona control residual de bacterias que causan malos olores en ambientes húmedos.

Se puede usar en las siguientes superficies, mosaicos, cerámicas, acero inoxidable, aluminio, cromados, metal galvanizado, vidrio y otras superficies duras no porosas.

Es ideal para el lavado y desinfección de todas las áreas de hospitales, escuelas, centros de cuidado de animales, instalaciones veterinarias.

En avicultura indicada para todas las etapas donde haya que aplicar medidas de bioseguridad, incluyendo naves, plantas de incubación, equipos de transporte, cajas plásticas para pollos.

Establos, corrales, vehículos de transporte de animales mayores. Se puede recomendar su uso en nebulizaciónes en frío en forma adicional a otras medidas sanitarias.

Para limpieza y desinfección de huevos fértiles, idealmente hacerlo no más de 3 horas de haber sido puesto. La temperatura de

la solución desinfectante debe estar entre 35 y 41 grados Celsius de temperatura.

Las superficies y equipos que se desinfecten con esta solución de Tektrol deben permanecer en contacto con el producto por lo menos 10 minutos.

Como aerosol para rociarse las botas y la ropa de trabajo, para romper el esparcimiento de enfermedades de un sitio a otro.

Para nebulizaciónes se recomienda el uso de BIO- FOG diseñado para especialmente para dispersar en el aire soluciones dosificadas a 4 ml por litro de agua. Calcule el tiempo de nebulización en 3 minutos por cada metro cúbico.

Precauciones:
Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
Corrosivo en forma concentrada.
Si se ingiere su presentación concentrada puede ser dañino para la salud o mortal.
Lavarse muy bien con agua y jabón después de trabajar con este producto y antes de beber, comer o fumar.

Condiciones de conservación:
Mantener los envases bien cerrados.
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el calor excesivo y la alta humedad.

Presentación:
Envases de plástico con capacidad de 1 galón (Cod. 20-506)
Tambores de 55 galones. Aerosol de 482 gramos (Cod. 20-508)

TIAMULINA 10%

Antibiótico premix.

Composición por libra:

Fumarato de Tiamulina ....100 gr.
Excipiente c.s.p..... 1000 gr.

Accion:

TIAMULINA AL 10% esta formulada para ser incorporada a los alimentos, siendo altamente efectiva sobre Micoplasmas, Haemophilus, Actinobacillus, Serpulina, Leptospira y bacterias Gram positivas que afectan a las aves y cerdos.

Indicaciones:

•Aves: Para el control de la Enfermedad Crónica Respiratoria (CRD).
•Cerdos: Para prevenir y tratar Neumonia Enzoótica debido a Micoplasma sp, Pleuroneumonia producida por Actinobacillus, Poliserositis causada por Haemophilus y disentería porcina causada por Serpulina (Treponema) hyodysenteriae.

Administracion:

Debe administrarse mezclado con el alimento.

Dosis:

Aves:
Dosis terapeutica C.R.D.
Pollas de 4 semanas: 10 libras por tonelada de alimento.
Pollas de 16 semanas: 15 libras por tonelada de alimento.
Gallinas de 9 meses: 12 libras por tonelada de alimento.
Broilers hasta 4 semanas: 7 libras por tonelada de alimento
Broilers sobre 4 semanas: 8 libras por tonelada de alimento.

Cerdos:
Dosis preventiva Neumonia Enzoótica:
Madres: 2 libras por tonelada de alimento durante 10 días.
Lechones: 1 libra por tonelada de alimento durante 4 semanas.
Crianza: 10 onzas por tonelada de alimento durante todo el periodo.
Engorda: 7 onzas por tonelada de alimento durante todo el periodo.

Dosis curativa Neumonia Enzoótica:
Todo tipo de animal 4 libras por tonelada de alimento por 10-14 días.

Dosis preventiva Disenteria Porcina:
Todos los tipos de animales 1 libra por tonelada de alimento por 6 semanas..

Dosis curativa Disenteria Porcina:
Todos los tipos de animales 4 libras por tonelada hasta 3 días post síntomas.

Contraindicaciones:
No usar junto a anticcocidales como son Salinomicina, Maduramicina, Naracina.

Período suspensión:
7 días.

Precauciones:
No deben usarse recipientes metálicos.
Evitar el contacto con ojos, piel y ropas.

Precauciones:
TIAMULIN 10% no debe administrarse a animales que estén recibiendo alimentos con los anticcocidiales ya citados.

Condiciones de almacenamiento:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el calor excesivo y la alta humedad.

Presentación:
Fundas multicapas de papel y plástico de 15 Kg.
(Cod. 30-030)

TIAMULINA PURA

Antibiótico hidrodispersable.

Composición:
Por frasco 20 gramos:
Fumaráto de Tiamulina ..... 20 gr.

Acción:
Compuesto soluble en polvo a base de TIAMULINA, derivado semisintético del antibiótico Pleuromulina.

Indicaciónes:
Aves específicamente indicada para el control preventivo y curativo de la Enfermedad Crónica Respiratoria, Causada por Micoplasma gallisepticum y/o Micoplasma synoviae, aun para la complicada con bacterias Gram positivas y Haemophilus paragallinarum.
Cerdos, especialmente indicado para el tratamiento de la Disentería porcina, Neumonia Enzoótica y Pleuroneumonía por Actinobacillus.

Administración:
Se administra por vía oral en el agua de bebida.

Dosificación:

Aves:
Preventiva: 1 frasco por 50 galones de agua
Curativa: 2 frascos por 50 galones de agua.

Cerdos:
Para prevenir y tratar la Neumonia enzoótica y Disentería, todos los tipos de cerdos.

Dosis preventiva: 18 gr. por 50 galones de agua por 10dias.

Dosis terapéutica: 36 gr. por 50 galones de agua por 10 días.

Para tratar la Pleuroneumonía: 48 gramos por 50 galones de agua por 10 días.

Contraindicaciones:
No usar junto a los anticcoidales indicados.

Período de suspensión:
7 días.

Precauciones:
Este antibiótico no debe administrarse a animales que reciban alimento con anticoccidiales cuyo principio activo sea la Monensina, Salinomicina o la Narasina.

Condiciones de almacenamiento:
Mantener los envases bien cerrados.
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el calor excesivo y la alta humedad.

Presentación:
Frascos de 20 gr (Cod. 30-003)

TYLO 400

Antibiótico para el alimento.

Composición:
Tilosina ....40 gr.
Excipiente c.s.p..... .454 gr.

Acción:
TYLO 400 ataca bacterias Gram negativas y Gram positivas. Tilosina es especialmente activa contra Micoplasmas.

Indicaciones:
En aves en general para el control de la CRD, para broilers como promotor de crecimiento y mejora la eficiencia alimenticia, en aves de postura como promotor de postura, mejora la calidad de la cáscara y peso del huevo y reduce enteritis inespecíficas. En cerdos TYLO 400 como promotor de crecimiento, control de neumonías causadas por micoplasmas, rinítis atrófica y principalmente control de ileítis o enterítis proliferativa.

Administración:
Mezclado en el alimento de los cerdos y de las aves.

Dosificación:
Como promotor del crecimiento:
En pollos broilers……. 1 libra por tonelada de alimento.
En aves de postura……1/2 a 1 libra por tonelada de alimento.
En cerdos dependiendo de la edad……. 1/2 a 2 libras por tonelada de alimento.

Como tratamiento:
Control de CRD en broilers y aves de postura……10 a 20 libras por tonelada de alimento.
En cerdos:
Control de neumonías……2 libras por tonelada de alimento.
Tratamiento de ileítis……. 2 libras por tonelada de alimento.

Contraindicaciones:
No tiene.

Período de suspensión:
7 días.

Precauciones:
Especial cuidado en su dilución en el alimento.

Condiciones de almacenamiento:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el calor excesivo y la alta humedad.

Presentación:
Fundas de papel multicapas de 50 libras.
(Cod. 30-091)

TYLO 400 PLUS

Antibiótico quimioterápico.

Composición por libra:

Sulfametazina sódica..... ..40 gr.
Tilosina ....40 gr.
Excipiente..... 454 gr.

Acción:

TYLO 400 PLUS es una combinación de un antibiótico, Tilosina y una sulfa potenciándose ambos productos para tener un mayor espectro de acción, atacando bacterias Gram negativas y Gram positivas. Tilosina es especialmente activa contra Micoplasmas.

Indicaciones:

En cerdos para el control de neumonías enzoóticas, el control y tratamiento de la rinitis atrófica, para prevenir enteritis bacteriana, enteritis necrótica y linfadenitis producida por Estreptococo grupo E.

Administración:

Mezclado en el alimento de los cerdos.

Dosificación:

Como promotor del crecimiento:
Lechones……..….. 2 libras por tonelada de alimento
Crianza……...…..…1 libra por tonelada de alimento.
Engorda……... 2 libra por tonelada de alimento.

Para tratamiento de neumonías, enteritis, linfoadenitis:
Todos los tipos…….2 libras por tonelada de alimento.

Contraindicaciones:

No usar cuando se esten utilizando otros productos que contengan Sulfa.

Período de suspensión:

7 días.

Precauciones:

No dar a aves, el contenido de sulfa es peligroso en estos animales si no hay un control estricto.

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el calor excesivo y la alta humedad.

Presentación:

Fundas de papel multicapas de 50 libras. (Cód. 30-090)

UBREX

Desinfectante para teat-dipping.

Composición por 100 ml:
Iodo activo..... 400 mg.
Suavizantes orgánicos, excipiente c.s.p.……100 ml.

Acción:
Ubrex es un desinfectante de amplio espectro de acción contra bacterias Gram positivas y Gram negativas, hongos y virus. Posee buenas propiedades humectantes y excelente estabilidad.

Indicaciones:
Está especialmente formulado como desinfectante para la inmersión de pezones (Teat-dipping) antes y después de la ordeña, con cuya operación se logra prevenir la mastitis originada por microorganismos contagiosos y ambientales. UBREX asegura una excelente tolerancia dérmica, incluso en casos de ulceras o grietas de los pezones, ya que el producto tiene un efecto curativo que se traduce en la desaparición de los estados irritativos de la piel, asperezas y otras manifestaciones.

Administración:
1. - Inmediatamente después de retirada la unidad de ordeño, sumergir los pezones en UBREX puro. Su efecto radica en la rápida destrucción de los microorganismos de la piel de los pezo - nes, que son los que causan la mastitis de origen exógeno.
2. -Al pasar una vaca al periodo de secado, se recomienda sumergir sus pezones en UBREX, una vez al día durante 3-4 días siguientes a la ultima ordeña o según el criterio del Medico Veterinario.
3. -Aplique UBREX permitiendo un tiempo de contacto de 15-30 segundos.
4. - Seque las ubres con una toalla de papel desechable.

Contraindicaciones:
No tiene.

Período de suspención:
No tiene.

Precauciones:
Siempre saque los primeros chorros de leche en el pre-dipping.
Limpie las ubres según sea necesario.
No devuelva el remanente de UBREX al envase.
El aplicador utilizado para hacer dipping debe ser vaciado y limpiado con agua potable después de cada ordeña.
Evitar el contacto con la piel y los ojos.
Producto de uso externo.

Condiciones de almacenamiento:
Mantener el envase bien cerrado.
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el calor excesivo y la alta humedad.

Presentación:
1 Galón (Cod. 40-003)

VIOPROP-11

Antifungico.

Composición:
Metilpararosanilina (Violeta de Gensiana)..... 16 gr.
Ácido Propionico ..... 125 gr.
Propionato de Calcio ..... 125 gr.
Excipiente c.s.p..... 1000 gr.

Acción:
VIOPROP-11 tiene una amplia acción antifúngica a la vez que inhibe el desarrollo de bacterias en el alimento. Violeta de Gensiana impide la acción nociva de los hongos sobre los alimentos previniendo los cuadros severos provocados por estos. Acido Propionico tiene un amplio espectro de acción por ello conserva todo tipo de alimentos para animales en forma rápida y duradera, reduciendo y restringiendo en forma duradera la flora de hongos, tanto en los casos de poca humedad, como también existiendo una humedad elevada, además reduce el contenido de bacterias del alimento para animales.

Indicaciones:
Añadido a granos, cereales, piensos y materias primas, previene la contaminacion por hongos, con lo cual se evita la aparición de estos problemas y consigue una mejora en la utilización del alimento y en el rendimiento. Previene y trata la aparición de Aspergilosis, Fusariosis, Candidiasis, Blastomicosis. Tiene una acción antibacteriana especialmente contra Salmonela.

Administracion:
Mezclado en el alimento.

Dosificación:
Preventivo: 1-2 libras por tonelada de alimento.
Curativo: 2.5-4 libras por tonelada de alimento.

Contraindicaciones:
No tiene.

Período suspensión:
No tiene.

Condiciones de almacenamiento:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el calor excesivo y la alta humedad.

Presentación:
Funda multicapa de 50 libras. (Cod. 20-457)

VITA-C

Soluble.

Composición:
Cada frasco contiene:
Vitamina C (ácido ascórbico)..... 1000 gr.

Acción:
VITAMINA C interviene en el organismo en los procesos de oxidación y reducción transportando hidrogeno. Participa en la formación de corticosteroides y en la coagulación de la sangre, aumenta las defensas del cuerpo frente a infecciones y tensiones de todo tipo (stress). Su carencia produce una mayor predisposición a las infecciones, en el stress por calor disminuye la estabilidad de la cáscara.

Indicaciones:
Para tratar aves y cerdos que presentan síntomas carenciales. Para ayudar al stress provocado por el calor. Para mejorar el estado general de los animales y ayudar en la calidad del cascaron.

Administración:
En el agua y alimento de las aves, en el alimento de los cerdos.

Dosificación:
Pollos de engorde y gallinas: 50 gramos por tonelada de alimento.
Pavos: 70 gramos por tonelada de alimento.
Cerdos: 150 gramos por tonelada de alimento.
En situaciones de estrés calórico en aves, agregar en el agua en el momento de la crisis 5 onzas por cada 50 galones.

Contraindicaciones:
No tiene.

Periodo suspensión:
No tiene.

Precauciones:
La VITAMINA C arde en contacto con el fuego, pero no se inflama espontáneamente.

Condiciones de almacenamiento:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el calor excesivo y la alta humedad.
Mantener los envases bien cerrados.

Presentación:
Frascos de 1000 gr. (Cód.20-211)

VITAMINA D3

Soluble.

Composición:
Vitamina D3 (calciferol) ..... 1.250.000 UI.
Excipiente c.s.p..... 50 gr.

Acción:
La vitamina D3 regula el metabolismo del calcio y del fósforo, favorece especialmente la absorción de calcio y fósforo en el intestino, regula la eliminación de calcio y fósforo por los riñones, regula la incorporación de calcio y fósforo en el esqueleto, mejora la tasa de intercambio de calcio y fósforo.

Indicaciones:
Cuando se encuentra alterado el metabolismo del calcio y fósforo, descalcificación en los huesos en formación (raquitismo), descomposición de la sustancia mineral de los huesos (osteodistrofia), deformaciones de los huesos y articulaciones, perturbaciones en el crecimiento, fractura espontánea de los huesos, deficiente estabilidad de la cáscara de los huevos.

Administración:
En el agua de bebida de los animales.

Dosificación:
Un sobre en 400 galones de agua, darlo por 5 días. En el caso de gallinas de postura comercial que presenten problemas de calidad de cáscara se recomienda usarla 3 días a la semana durante 3 semanas consecutivas, volviéndose a repetir el tratamiento 30 días mas tarde.

Contraindicaciones:
No usar junto con productos que tengan un alto contenido de vitamina D3.

Período de suspención:
No tiene.

Precauciones:
Ninguna en especial

Condiciones de almacenamiento:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el calor excesivo y la alta humedad.
Mantener los envases bien cerrados.

Presentación:
Sobres de aluminio de 50 gramos cada uno.
(Cod. 20-205)

VITAMINA E + SELENIO

Soluble.

Composición:
Vitamina E.....25,000 UI.
Selenio.....848 mg.
Excipiente c.s.p..... 200 gr.

Acción:
La vitamina E es necesaria para el metabolismo de las células, actuando también como antioxidante, reduciendo en vivo la autooxidación de los ácidos grasos no saturados.
El Selenio en combinación con la vitamina E, participan evitando los daños que producen los radicales libres resultantes de la peroxidación con ácidos grasos.

Indicaciones:
En terneros, corderos, cerdos y aves para el tratamiento de la distrófia muscular. En los casos de encéfalomalacia en las aves. Para tratar la diátesis exudatíva y mejorar los niveles de fertilidad.

Administración:
En el agua de bebida de los animales.

Dosificación:
• Aves:
Preventivo: 1 sobre por 200 galones de agua, por 5 días.
Curativo: 2 sobres por 200 de agua, por 5 días.
• Terneros y cerdos:
Preventivo: 2 sobres por 200 galones de agua, por 5 días.
Curativo: 4 sobres por 200 galones de agua, por 5 días.
Equinos:
• Para el tratamiento de degeneración muscular o trastornos musculares: 1 sobre en 20 galones de agua, por 5 días.

Contraindicaciones:
No usar junto con productos que tengan alto contenido de selenio.

Período de suspención:
No tiene.

Precauciones:
No deben de sobrepasarse los tiempos de tratamiento, teniendo en cuenta que Selenio provoca intoxicaciones en todos los animales.

Condiciones de almacenamiento:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el calor excesivo y la alta humedad.
Mantener los envases bien cerrados.

Presentación:
Sobres de aluminio de 200 gramos cada uno.
(Cod. 20-215)

VITA-K

Soluble.

Composición:
Vitamina K (Bisulfito Sodico de Menadiona)..... 1.000 mg.
Excipiente c.s.p..... .....50 gr.

Acción:
La VITAMINA K participa en el metabolismo celular y cataliza en el hígado la formación de algunas proteínas importantes para la coagulación de la sangre, entre otros la protrombina. Su deficiencia entre otros síntomas mostrara una tendencia a hemorragias en diferentes tejidos y órganos.

Indicaciones:
Como ayuda en las enfermedades que afectan el tracto digestivo: coccidiosis, enteritis.
Para evitar las hemorragias durante el despique.Como antídoto en intoxicaciones por sustancias que provoquen hemorragias

Administración:
En el agua de las aves.

Dosificación:
Preventivo: 1 sobre por cada 50 galones de agua.
Curativo: 2 sobres por cada 50 galones de agua.

Contraindicaciones:
No tiene.

Periodo suspensión:
No tiene.

Precauciones:
Para evitar hemorragias durante el despique dar la dosis curativa 2 días antes de realizarlo.

Condiciones de almacenamiento:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el calor excesivo y la alta humedad.

Presentación:
Sobres plásticos de 50 gr.
(Cod. 20-201)

VITAMINAS B-K

Soluble.

Composición:

Por sobre:

Vitamina B1	3,600 mg.
Vitamina B2	8,600 mg.
Vitamina B6	3,200 mg.
Vitamina B12	32 mg.
Pantotenato de Calcio	9,2..00 mg.
Niacina	12,000 mg.
Acido Folico	2,000 mg.
Vitamina K3	8,000 mg.
Excipiente c.s.p	200 gr.

Acción:

Las VITAMINAS B-K tienen un rol importante en el metabolismo de los hidratos de carbono y proteínas a nivel hepático. También como es el caso del ácido fólico, participa en la formación de glóbulos rojos y blancos. Algunas de ellas ayudan a proteger la mucosa intestinal.

A nivel hepático la vitamina K participa en la formación de la protrombina factor importante en los procesos de coagulación sanguínea.

Indicaciones:

Prevencion y tratamiento de las carencias de vitaminas del complejo B y vitamina K.

Como ayuda en los periodos de stress, calor, cortes de pico, traslados, etc.

Ayuda a mejorar la conversión de alimentos.

Para acelerar la recuperación de los animales después de enfermedades o tratamientos con antibióticos o sulfas.

Como coadyuvante en animales que han sufrido intoxicaciones por micotoxinas.

En aves con alteraciones nutricionales que han producido hígado graso.

Administración:
Disuelto en el agua de bebida.

Dosificación:
Aves:
Preventivo: 1 sobre por 200 galones de agua de bebida por 3 días.
Curativo: 2 sobres por 200 galones de agua de bebida por 7 días.

Cerdos:
Lechones: 1 sobre por 200 galones de agua de bebida por 3 días.

Engorde: 2 sobres por 200 galones de agua de bebida por 5 días

Contraindicaciones:
No tiene.

Periodo suspensión:
No tiene.

Precauciones:
No guardar soluciones ya preparadas por más de 48 horas.

Condiciones de almacenamiento:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el calor excesivo y la alta humedad.
Mantener los envases bien cerrados.

Presentación:
Sobres de papel de aluminio de 200 gr. (Cod. 20-499)

VITAMINAS Y ELECTROLITOS

Mezcla soluble de vitaminas y electrolitos.

Composición:

Vitamina A	3,900.000 UI.
Vitamina D3	585.000 UI.
Vitamina E	2,000 UI.
Vitamina B2	390mg.
Pantotenato de Calcio	4.384 mg.
Ácido Fólico	98 mg.
Bisulfito Sodico de Menadiona	1,560 mg.
Vitamina B1	195 mg.
Potasio	1 %
Sodio…	2 %
Excipiente c.s.p.	200 gr.

Acción:

Mezcla de vitaminas y electrolitos solubles formuladas para ayudar a las aves en los momentos de stress, altas temperaturas, deshidratación, periodos de convalecencia de enfermedades.

Indicaciones:

VITAMINAS Y ELECTROLITOS se usan para mejorar la asimilación y conversión de alimento, mejorar los parámetros productivos cuando las aves han estado bajo stress, especialmente en las épocas de altas temperaturas. Para recuperar los animales enfermos.

Administración:

En el agua de las aves.

Dosificación:

Aves:
Un sobre por 200 galones de agua de bebida por 3 a 5 días, repetir si es necesario.
En casos graves 2 sobres por 200 galones de agua de bebida por 3 a 5 días.

Contraindicaciones:

No tiene.

Periodo suspensión:

No tiene.

Precauciones:
Para garantizar la máxima eficiencia de VITAMINAS Y ELECTROLITOS, no guardar soluciones ya preparadas por más de 48 horas.

Condiciones de almacenamiento:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el calor excesivo y la alta humedad.
Mantener los envases bien cerrados y protegidos de la luz.

Presentación:
Sobres de aluminio de 200 gramos. Código (20-557)

ZOOVIT 1 MAS ENZIMAS

Aditivo para el alimento. Contiene enzimas.

Composición por dósis de 3 libras:
Rovabio ....50 gramos.
Fitasa ..... 500 unidades.
Zoovit-1 ....3 libras.

Acción:
ZOOVIT-1 MAS ENZIMAS aporta las vitaminas y minerales necesarios para cubrir los requerimientos de los pollos de engorde. Además contiene las enzimas fitasa y rovabio, con la finalidad de aprovechar mejor el fósforo contenido en los vegetales y también usar energía no disponible normalmente (polisacáridos no almidones) a su vez disminuir la viscosidad del contenido intestinal mejorando la absorción de los nutrientes.

Indicaciones:
ZOOVIT 1 MAS ENZIMAS se emplea como aditivo en todos los alimentos de pollos de engorde.

Administración:
En los alimentos de pollos de engorde

Dosificación:
3 libras por tonelada de alimento.

En alimentos de Crecimiento y Engorde: 3 libras por tonelada de alimento.

Condiciones de conservación:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el calor excesivo y la alta humedad.
Mantener los envases bien cerrados.
No guardar envases abiertos.

Presentación:
Fundas multicapas de 20 Kg. (Cod. 20-412)

ZOOVIT 3

Premezcla vitaminas y minerales.

Composición:

Vitamina A	7.500.000 UI.
Vitamina D3	1.875.000 UI.
Vitamina E	5.400 UI.
Vitamina B2	4.5 gr.
Ácido Nicotínico	22.5 gr.
Pantotenato de Calcio	6 gr.
Vitamina B12	12 mg.
Colina	255 gr.
Vitamina K	3 gr.
Manganeso	60 gr.
Hierro	30 gr.
Zinc.	30 gr.
Cobre	1.5 gr.
Yodo	1.5 gr.
Cobalto	150 mg.
Vehiculo c.s.p	1.5 Kg.

Acción:
ZOOVIT-3 aporta las vitaminas y minerales necesarios para cubrir los requerimientos de las pollas de reemplazo y de las gallinas de postura comercial. Sus componentes son vitaminas y minerales de óptima calidad, sometidas a rigurosos controles de calidad, importadas directamente y en permanente renovación de stoks. Las mezclas son elaboradas con máxima exactitud y homogeneidad, lo que les confiere alta efectividad.

Indicaciones:
ZOOVIT 3 se emplea como aditivo en todos los alimentos de pollas de reemplazo y gallinas de postura comercial, para cubrir las necesidades tanto de vitaminas como de minerales.

Administración:
En los alimentos de pollas de reemplazo y gallinas de postura comercial.

Dosificación:
En alimentos Iniciadores de pollas de reemplazo: 4 libras por tonelada de alimento.
En alimentos de Crecimiento, Desarrollo, Pre-postura y Postura comercial: 3 libras por tonelada de alimento.

Condiciones de conservación:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el calor excesivo y la alta humedad.
Mantener los envases bien cerrados.
No guardar envases abiertos.

Presentación:
Fundas multicapas de 20 Kg. (Cod. 20-403)

ZOOVIT 5

Premezcla vitaminas y minerales.

Composición:

Vitamina A	6.000.000 UI.
Vitamina D3	1.000.000 UI.
Vitamina E	10.000 UI.
Tiamina	650 mg.
Vitamina B2	5.000 mg.
Piridoxina	950 mg.
Ácido Fólico	175 mg.
Acido Nicotinico	16.000 mg.
Pantotenato de Calcio	12.000 mg.
Vitamina B12	12 mg.
Colina	200.000 mg.
Vitamina K	2.000 mg.
Biotina	100 mg.
Manganeso	45.000 mg.
Magnesio	20.000 mg.
Hierro	90.000 mg.
Zinc	150.000 mg.
Cobre	8.000 mg.
Yodo	600 mg.
Cobalto	200 mg.
Selenio	100 mg.
Vehiculo c.s.p	1.5 Kg.

Acción:

ZOOVIT-5 aporta las vitaminas y minerales necesarios para cubrir los requerimientos de los cerdos en sus diferentes etapas. Sus componentes son vitaminas y minerales de optima calidad, sometidas a rigurosos controles de calidad, importadas directamente y en permanente renovación de stoks. Las mezclas son elaboradas con máxima exactitud y homogeneidad, lo que les confiere alta efectividad.

Indicaciones:

ZOOVIT 5 se emplea como aditivo en todos los alimentos de cerdos, para cubrir las necesidades tanto de vitaminas como de minerales.

Administración:

En todos los alimentos de cerdos.

Dosificación:

En alimentos Pre iniciadores e Iniciadores: 4 libras por tonelada de alimento.

En alimentos de Crecimiento, Desarrollo, Engorde, Reproductoras Preñadas y Paridas: 3 libras por tonelada de alimento.

Condiciones de conservación:

Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el calor excesivo y la alta humedad.
Mantener los envases bien cerrados.
No guardar envases abiertos.

Presentación:
Fundas multicapas de 20 Kg. (Cod. 30-017)

ZOOVIT 7

Premezcla vitaminas y minerales.

Composición:

Calcio	300 gr.
Fosforo	220 gr.
Sodio	23 gr.
Vitamina A	400.000 UI.
Vitamina D3	60.000 UI.
Vitamina E	150 UI.
Magnesio	1.5 gr.
Manganeso	1.500 mg.
Molibdeno	15 mg.
Hierro	1.500 mg.
Zinc	3.000 mg.
Cobre	600 mg.
Yodo	40 mg.
Cobalto	40 mg.
Selenio	15 mg.
Vehículo c.s.p	2 Kg.

Acción:

ZOOVIT-7 aporta las vitaminas y minerales necesarios para cubrir los requerimientos de vacas lecheras, vacas de carne, terneros, ganado de engorda. Sus componentes son vitaminas y minerales de óptima calidad, sometidos a rigurosos controles de calidad, importados directamente y en permanente renovación de stoks. Las mezclas son elaboradas con máxima exactitud y homogeneidad, lo que les confiere alta efectividad.

Indicaciones:

ZOOVIT 7 se emplea como aditivo en todos los alimentos de ganado vacuno, para cubrir las necesidades tanto de vitaminas como de minerales.

Administración:

En los alimentos de vacas lecheras, vacas de carne, terneros, ganado de engorde.

Dosificación:

Vacas lecheras: 30-60 gramos por animal al día.
Vacas de carne: 20-30 gramos por animal al día.
Terneros: 10-15 gramos por animal al día
Ganado de engorde: 30-50 gramos por animal al día.